Птицы Болотнинского района

Скопа

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Отряд Соколообразные *(Falconiformes)* Семейство Скопиные *(Pandionidae)*

Таксономическое положение. Политипический вид. Единственный представитель рода и семейства. Пять подвидов. Весь ареал вида в России занимает номинативный подвид.

Статус. III категория.

Краткое описание вида. Крупная хищная птица с длинными и сравнительно узкими крыльями. У взрослых самцов и самок верх темно-бурый, голова охристо-белая с черным широким пятном через глаз. Перья затылка удлинены. Низ охристо-белый с бурыми пятнами на зобе. Маховые темно-бурые со светлыми основаниями. Хвост с поперечным рисунком. Цевка не оперена, пальцы очень сильные с острыми, круто загнутыми когтями. Молодые отличаются охристыми каемками бурых перьев на спине. Окончательный наряд надевают на втором году жизни. В природе скопа хорошо отличается по двухцветной окраске - темной спине и белому низу. Полет ее очень легкий.

Общее распространение. Населяет Северную Америку, Евразию, Африку и Австралию. В России распространена в лесной зоне до лесотундры азиатской части местами гнездится в лесостепной зоне.

Распространение в области. В лесостепи найдена на гнездовании у северного побережья оз. Чаны в конце XIX века. В последние годы здесь наблюдали взрослых птиц, но гнезд не обнаружено. Гнездится в верховьях р. Чека (Кыштовский р-н) и в верховьях р.Тартас (Северный р-н), неоднократно скопу отмечали на оз.Убинское, но гнезд не найдено. На пролете отмечена в Колыванском, Венгеровском, Северном, Чановском, Здвинском, Карасукском районах, на Новосибирском водохранилище, а также в пойме р.Оби ниже г.Новосибирска

Места обитания. Скопа - узкоспециализированный хищник, питающийся рыбой. Всегда придерживается водоемов богатых рыбой. Гнездится только на деревьях по берегам рек и озер.

Численность и тенденции ее изменения. На основании имеющихся данных нет возможности определить тенденцию изменения численности скопы в области, но повсюду она редка.

Основные лимитирующие факторы. Сокращение мест для гнездования в результате вырубки высокоствольных лесов по берегам водоемов. Хозяйственное освоение и загрязнение водоемов, что приводит к сокращению кормовой базы. Браконьерство и разорение гнезд - также один из

важных факторов снижения численности. Особенности биологии и экологии. Моногам. К размножению приступает в возрасте трех лет. Весной под Новосибирском появляется в конце апреля. Одни и те же гнезда использует по много лет. Обычно гнездо располагается на обломанной вершине или толстых ветвях высокого дерева, возвышающегося над остальными. Может использовать искусственные постройки. В кладке обычно 2-3 яйца. Насиживают оба родителя 35-38дней. Птенцы остаются в гнезде около двух месяцев, но и после вылета из гнезда держатся вместе с родителями. Отлет происходит в сентябре, осенний пролет заканчивается в первой половине октября. Скопа питается в основном рыбой массой до 2 кг и лишь изредка, при отсутствии рыбы, отлавливает водоплавающих птиц и водяных полевок.

Разведение. Размножаются в некоторых зоопарках. Принятые меры охраны. Внесена в Красную книгу РФ и в Приложение II к Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Выявление гнезд скопы и создание зон покоя. В местах, благоприятных для гнездования скопы, желательна установка искусственных платформ и сооружение гнезд.

Подорлик большой

Aquila clanga Pallas, 1811

Отряд Соколообразные *(Falconiformes)*

Семейство Ястребиные *(Accipitridae)*

Таксономическое положение. Монотипический вид. Один из 5 видов рода в фауне России и один из 4 видов в фауне области.

Статус. III категория. Вид внесен в Красный список МСОП со статусом VU C2a (уязвимый вид с численностью менее 10000 половозрелых особей и резко фрагментированным ареалом).

Краткое описание вида. Крупный, очень темный орел. Самцы и самки окрашены одинаково. Оперение взрослых птиц однотонное, черно-бурое. На надхвостье у некоторых птиц может быть беловатое пятно. Восковица и лапы желтые. Клюв и когти черные. У молодых птиц верх с охристыми или бледно-буроватыми пестринами. Голос обычно звонкое «кьяк-кьяк-кьяк».

Общее распространение. Лесостепь и южно-таежные леса Евразии от юга Финляндии к востоку до Приморья и Северо-Восточного Китая.

Распространение в области. Гнездится в основном в северных и центральных районах области. За последние десятилетия гнездование отмечено вблизи с.Кама (Кубышевский р-н) у с.Мусы (Каргатский р-н) и у южного побережья оз.Убинское (Каргатский р-н),у пос.Ильюшино (Чулымский р-н) на севере Усть-Тарского района и у с.Плехановка (Доволенский р-н). Ранее на гнездовье был встречен у северо-восточного побережья оз.Чаны. По-видимому,

гнездился у Озера Карачи . В летнее время в последние годы встречался на побережье и островах оз.

Места обитания. Березовые колки и высокоствольные смешанные леса в сочетании с открытыми участками лугов и полей. Оптимальные условия для него складываются там, где березовые колки расположены вблизи озер, в заболоченных низинах и долинах рек.

Численность и тенденции ее изменения. Для большого подорлика, по-видимому, характерно неравномерное распределение по территории в период гнездования и значительные межгодовые колебания в отдельных местах. В Куйбышевском р-не у с.Кама количество гнезд на контрольном участке площадью 40 кв. км изменялось от 1 до 8,а в отдельные годы птицы совсем не гнездились. Причем за 13 лет число гнездящихся пар сократилось с 8 в 1959 г. до 1 в 1971 г. Вероятно, это связаны с динамикой численности мышевидных грызунов, в первую очередь водяной полевки. Судя по увеличению летних встреч большого подорлика у оз.Чаны, за последние 5 лет его численность растет.

Основные лимитирующие факторы. Численность большого подорлика резко снизилась в некоторых частях ареала в результате мелиорации и распашки пойм рек, осушения заболоченных участков, сильно возросшего фактора беспокойства и браконьерства.

Особенности биологии и экологии. Моногам. Весной в области появляется в середине апреля. Гнездовые участки, как правило, постоянные одни и те же гнезда используются по много лет. Гнезда располагаются на березах, осинах, реже на тальнике, на высоте от 3 до 15 м . К откладке яиц птицы приступают в середине мая. В кладке одно- два белых с буроватыми пестринами яйца. Насиживание начинается с первого яйца. В выводке обычно один птенец, так как младший чаще всего погибает. Летать молодые птицы начинают в возрасте 2,5 месяцев. В условиях Барабы питаются в основном мышевидными грызунами, главным образом водяной полевкой (до 70-90 %),реже отлавливают куньих и зайцев. Из птиц в питании присутствуют тетеревиные, утки и воробьиные.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ и в Приложение II к Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Выяснение современного распространения в период размножения и организация охраны наиболее важных участков. Усиление просветительской и природоохранной деятельности с целью исключения разорения гнезд и отстрела птиц.

Крачка малая

Sterna albifrons Pallas, 1764

Отряд Ржанкообразные *(Charadriiformes)* Семейство Чайковые *(Laridae)*

Таксономическое положение. Политипический вид. Один из 4 видов в фауне России и 2 видов в фауне области. На территории России гнездится два

подвида. Восточная граница распространения номинативного подвида долина Оби.

Статус. III категория

Краткое описание вида. Мелкая крачка с черной «шапочкой» на голове. Лоб белый. Спина и крылья светло-серые. Хвост и спинная сторона белые. Концы крыльев темные. Лапы желтые, клюв желтый с черным концом. У молодых птиц «шапочка» серая, спинная сторона с черноватыми и охристыми пестринами. Маховые темней, чем у взрослых. Клюв бурый с желтым основанием. В природе от других крачек отличается мелкими **Общее распространение.** Гнездится в Северной Америке, в Евразии от атлантического до тихоокеанского побережья, в Западной и Северной Африке. В России распространена на север не далее 58-й параллели. Хотя малая крачка расселена широко, гнездится она спорадично, населяя морские побережья и долины рек Распространение в области. Гнездится на островах р.Обь в пределах Колыванского, Болотнинского и Мошковского районов и на водохранилище. В качестве гнездящейся приводится М.Д. Рузским для окрестностей курорта «Озеро Карачи», хотя в последнее десятилетие там не обнаружена. В период миграций и кочевок малая крачка отмечена на оз.Чаны и прилегающих водоемах .

Места обитания. В период размножения главным образом долины крупных рек. Колонии располагаются, как правило, на песчаных, галечных или илистых островах, намывных косах и материковых пляжах.

Численность и тенденции ее изменения. Почти везде малая крачка немногочисленна. Общая численность для территории бывшего СССР оценивалась в 50 тыс. пар. Во многих местах европейской части ареала отмечается ее снижение. На территории Новосибирской области также отмечается снижение численности малой крачки за последние 20 лет. Количество колоний на ряде островов р.Обь сократилось в 2-3 раза. В 1996-1997 гг. общее количество гнездящихся пар не превышало 90-100. Основные лимитирующие факторы.

Большое количество гнезд погибает в результате паводков, штормов, а также проходящих моторных лодок и судов, поскольку колонии располагаются близко к береговой линии. Уничтожают гнезда и колонии хищные птицы, в том числе чайки. Часто гнезда гибнут в результате постоянного посещения колоний отдыхающими и туристами. Фактор беспокойства некоторые авторы считают основной причиной снижения численности малой крачки в Европе в последнее столетие.

Особенности биологии и экологии. К размножению приступают в возрасте 2-3 лет. Моногамы. Колонии малых чаек обычно невелики и не превышают 50 пар. В Новосибирской области колонии чаще всего насчитывают 15-25 пар. Образуют как одновидовые колонии, так и совместные поселения с речной крачкой, а также с малым зуйком и некоторыми другими куликами. Гнездо - ямка в грунте, часто без выстилки.

Откладка яиц начинается в первой декаде июня и продолжается до середины июля. В кладке 1-3, чаще всего 3 яйца. Яйца имеют

песочный или песочно-охристый основной фон, по которому разбросаны мелкие, чаще всего округлые коричневые или коричнево-бурые пятна. Насиживают кладку самец и самка с первого яйца 18-22 дня. Молодые крачки поднимаются на крыло в возрасте 15-21 дня. Часто родители продолжают кормить молодых птиц и в период послегнездовых кочевок. Успех размножения сильно варьирует в разных поселениях.

В некоторых случаях гибнет вся колония в результате затопления. Питаются и выкармливают птенцов в основном водными беспозвоночными и мальками рыб.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Внесена в Красную книгу РФ. Специальных мер охраны в области не предусмотрено.

Необходимые меры охраны. Снижение фактора беспокойства и ограничение доступа людей в колонии.

Сова белая

Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)

Отряд Совообразные *(Strigiformes)* Семейство Совиные *(Strigidae)*

Таксономическое положение. Монотипический вид. Представитель монотипического рода.

Статус. III категория.

Краткое описание вида. Очень крупная сова (размером с филина). Общая окраска оперения самцов - снежно-белая. У отдельных птиц имеются бурые пестрины в области затылка, на концах маховых, иногда поперечные пестрины и «размытые» пятна на маховых, кроющих крыла, брюхе, надхвостье и рулевых. Количество бурых пятен варьирует у разных особей и подвержено возрастной изменчивости: с возрастом птицы постепенно белеют. У взрослых самок, которые заметно крупнее самцов, бурых тонов в окраске поверх белого фона значительно больше. Вершины перьев нижней части груди, брюха, спины, кроющих крыльев и хвоста образуют поперечную полосатость, выраженную у отдельных особей в разной степени. У молодых птиц поперечный рисунок еще более яркий. Для этой совы характерно густое оперение ног до самых когтей. Когти черные или темно-бурые, острые, круто загнутые. Голова кажется небольшой. Лицевой диск развит слабо, а перьевые «ушки» практически отсутствуют. Буровато-серый, бурый или темно-бурый клюв прикрыт жесткими перышками настолько, что едва выдается его вершина. Радужина глаз золотисто-желтая, глаза обычно прищурены. Летает относительно редко взмахивая крыльями. Посадка - со значительным наклоном вперед. Голос - звонкое «ки-ки-ки» и «кра-ау».

Общее распространение. Гнездится циркумполярно, в том числе на островах Северного Ледовитого океана. Южные пределы распространения определяются южными границами арктических тундр. Районы кочевок и зимовок охватывают всю лесную и лесостепную части азиатских районов страны; проникает белая сова и в степи. В Омской области это регулярно зимующий вид лесостепной зоны.
Распространение в области. В позднее осеннее и зимнее время белая сова может быть встречена на всей территории Новосибирской области. Места обитания. Белая сова гнездится в открытой тундре и лишь изредка встречается в лесотундре, где предпочитает широкие открытые пространства. Во время кочевок в любой природной зоне она изыскивает для охоты участки, напоминающие тундру. В лесной зоне она выбирает открытые просторы болот и полей, реже приречные долины и пустоши возле человеческого жилья; на юге же
предпочитает держаться в степи.

Численность и тенденции ее изменения. В гнездовом ареале численность этого вида сильно колеблется в разные годы в зависимости от обилия основного кормового объекта леммингов. В благоприятные годы (богатые леммингами) совы оседлы, и их большая часть остается на местах гнездования на зиму. Поэтому количество зимующих на территории Новосибирской области белых сов в разные годы может сильно меняться.
Основные лимитирующие факторы. Кроме случаев прямого истребления человеком, на территории области виду ничто не угрожает.

Особенности биологии и экологии. Кочующая и зимующая на территории обл, птица. Осенью первые птицы появляются с середины октября, а массовое их появление обычно связано с начинающимися снегом. Весной у Новосибирска иногда встречаются до конца апреля-начала мая, хотя большинство белых сов в это время находи уже на местах гнездования. Во время кочевок и зимовок питается теми животными которые обитают в районе ее местонахождения, главным образом грызунами.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Согласно природоохранному законодательству отстрел и обще всякое уничтожение сов запрещено.
Необходимые меры охраны. Необходимо вести разъяснительную работу среди охотников. Следует усилить штрафные санкции отстрел птиц.

Орлан-белохвост

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Отряд Соколообразные *(Falconiformes)*
Семейство Ястребиные *(Accipitridae)*

Таксономическое положение. Политипический вид. Один из пяти видов в фауне России и единственный представитель

рода в фауне области. Два подвида. Весь ареал вида в пределах России занимает номинативный подвид .

Статус. II категория. Включен в Красный список МСОП со статусом LR/nt (проблемный вид, близкий к уязвимым). **Краткое описание вида.** Крупная хищная птица с коротким, слегка клиновидным хвостом. Общая окраска бурая. Голова, а часто шея и грудь, светлее остального оперения. Хвост взрослых птиц чисто белый. Клюв желтоватый, ноги желтые, цевка оперена до половины. Самец и самка имеют сходную окраску и приобретают окончательный наряд в возрасте 4-5 лет. Молодые птицы темно-бурые, перья спины и верхних кроющих крыльев имеют охристо-бурые пятна и каемки, хвост темный со светлыми пестринами, клюв черноватый. С возрастом хвост приобретает более светлую окраску и у 4-5-летних птиц становится белым. Голос - лающее или каркающее «кра-кра-кра» или реже «кии-кии-кии». От орлов хорошо отличается в полете коротким и слегка клиновидным хвостом и более широкими крыльями.

Общее распространение. Евразия от тундры до Черного моря, Ирана, долины р.Или, Северной Монголии, Корейского полуострова и Сахалина. Номинативный подвид занимает весь ареал вида в пределах России.

Распространение в области. Гнездится в основном в северной лесостепи, подтаежных лесах, на верховых болотах и в пойме р.Оби. Наибольшее количество гнезд известно в окрестностях оз.Убинское. Пять-шесть пар гнездится по северному побережью, две-три - по южному и одна пара птиц - у восточного побережья озера на р.Майнак. Установлено гнездование на территории Кирзинского заказника, у оз.Тандово (Барабинский р-н), в окрестностях с.Кама (Куйбышевский р-н), в окрестностях с.Мураши (Усть-Таркский р-н), а также в верховьях р.Тартас (Северный р-н) и на болотах по северу области. В Кашламском бору птицы гнездились в начале 1980-х гг., и пара птиц постоянно держится в пойме у с.Красный Яр. По сообщению местны жителей, гнездится в окрестностях с.Шерстобитово (Чулымский р-н).В правобережной части области гнездование установлено у с.Мереть (Сузунский р-н). В период кочевок и пролета широко распространен по области и встречается регулярно в лесостепи на многих крупных водоемах.

Места обитания. Гнездится в высокоствольных разреженных лесах и колках по берегам крупных водоемов, богатых рыбой или водоплавающей птицей и редко посещаемых людьми. В период кочевок и пролета также придерживается водоемов, но иногда встречается и в степи.

Численность и тенденции ее изменения. В области гнездится приблизительно 30-50 пар. Данных для оценки долговременного изменения численности орлана белохвоста недостаточного за последние 20-30 лет снижения, по-видимому, не произошло. В России на конец 1970-х гг. число гнездящихся пар оценивалось в 1,5 тыс.

Основные лимитирующие факторы. В настоящее время основной урон популяции наносит разорение гнезд и отстрел птиц. Хозяйственное освоение территорий и беспокойство птиц у гнезда также являются главными факторами, ограничивающими распространение и численность орланов.

Особенности биологии и экологии. Моногам. К размножению приступают в возрасте старше 4 лет. В лесостепи появляются рано. У Новосибирска первые птицы отмечены в конце март. Массивные гнезда устраивают на деревьях и используют их по много лет. Как правило, пара имеет 2-3 гнезда, расположенных недалеко друг от друга, которые она может занимать в разные годы. Откладка яиц начинается в середине апреля и продолжается в отдельных гнездах до середины мая. Самка откладывает 1-3, чаще 2 яйца, которые насиживают около 30 дней оба партнера. Птенцы остаются в гнездах около двух месяцев, но еще после вылета держатся поблизости около месяца и подкармливаются родителями. Осенний пролет в лесостепи начинается в конце августа, но и летом во многих районах Барабы можно встретить кочующих неполовозрелых птиц. Заканчивается пролет в середине октября. Питается орлан в основном рыбой, а также водоплавающими и околоводными птицами, ондатрой, водяными полевками и зайцами.

Разведение. Известны случаи размножения в Екатеринбургском зоопарке.

Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ и в Приложение I к Конвенции СИТЕС. Охраняется на гнездовании в Кирзинском заказнике, а в период миграций и кочевок регулярно встречается в Здвинском заказнике.

Необходимые меры охраны. Инвентаризация гнезд и организация в местах размножения сезонных заказников или памятников природы.

Осоед обыкновенный

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Отряд Соколообразные (*Falconiformes*)

Семейство Ястребиные (*Accipitridae*)

Таксономическое положение. Монотипический вид. Один из двух видов рода в фауне России и области.

Статус. III категория. Редкий, спорадично распространенный вид.

Краткое описание вида. Крупная (заметно крупнее вороны) птица с относительно длинным хвостом и узкими крыльями. На лбу и вокруг глаз короткие, жесткие перья, напоминающие чешую. Цевка покрыта сетчатыми щитками. У взрослых птиц спинная сторона темно-бурая, брюшная - очень изменчивой окраски: от однотонно-бурой до светлой с бурым поперечным рисунком или с редкими темно продольными штрихами. Маховые бурые с черноватыми вершинами, беловатыми основаниями и темными поперечными полосами. Рулевые перья с тремя широкими темными хвоста поперечными полосами - двумя у основания у вершины. Встречаются птицы и одноцветно-бурые. Радужина желтая или оранжевая. Клюв черноватый, лапы

желтые, когти черные. Молодые птицы часто имеют светло окрашенную голову и светлые пятна на спине. Голос звучит как "кии-е" или быстрое "ки-кики". Летает обычно невысоко, полет легкий и маневренный.

Общее распространение. Западная Евразия от средней части Пиренейского полуострова к востоку до долины средней Оби и долины Томи. В Западной Сибири к северу примерно до 63-й параллели, к югу до Барнаула и Южного Алтая

Распространение в области. Довольно обычен вблизи г. Новосибирска, гнездится в окрестностях пос. Украинка и Останинка (Северный р-н), найдено гнездо возле с. Беспятое (Краснозерский р-н). Во время осеннего пролета отмечен в окрестностях с. Широкая Курья (Здвинский р-н), интенсивный пролет осоедов наблюдали в юго-восточной части Колыванского района. Заказники Болотнинского района

Места обитания. Придерживается преимущественно высокоствольных лесов, чередующихся с открытыми пространствами (полянами, вырубками, лугами). Отдельные пары обитают на значительном расстоянии одна от другой.

Численность и тенденции ее изменения. Весьма редок. В лесопарковой зоне Новосибирского Академгородка обилие этого вида составило 0,02 особей на км^2.

Основные лимитирующие факторы. Распространение и численность осоедов связаны с наличием и обилием перепончатокрылых (осы).

Особенности биологии и экологии. Гнездящаяся, перелетная птица с широким разрывом между областями гнездования и зимовки (зимует в тропических лесах Африки). Гнездится на деревьях, часто у опушки, гнезда обязательно "украшены" зелеными веточками с листьями. Кладка поздняя, в конце мая-июне, состоит из 1-2, очень редко 3-4 ярких красно- коричневых, часто с белым яиц. Насиживают оба родителя около месяца. Птенцов в гнезде бывает 1-2. Подросшие птенцы выбираются из гнезда с еще недоросшими маховыми и долго держатся около него. Основной корм осоедов - личинки общественных перепончатокрылых (ос и шмелей), а также сами насекомые. Осоед, сидя на ветке дерева или медленно летая, выслеживает гнездо, а найдя его, разрывает лапами. Ос ест вместе с жалом. Значительно реже питается гусеницами, кобылками, жуками, а также лягушками, змеями, мелкими птицами и грызунами.

Разведение. Нет данных.

Принятые меры охраны. Отстрел хищных птиц, в том числе осоеда, запрещен охотничьим законодательством.

Необходимые меры охраны. Выявить основные места гнездования и взять их под охрану.

Кобчик

Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Отряд Соколообразные *(Falconiformes)*

Семейство Соколиные *(Falconidae)*

Таксономическое положение. Монотипический вид. Представитель политипического рода, один из 9 видов рода в фауне России и 8 видов в фауне области.
Статус. IV категория.
Краткое описание вида. Мелкий сокол с длинными острыми крыльями. Взрослые самцы аспидно-сизые с серебристым налетом на маховых, с черноватой головой и рулевыми. Подбой крыла черновато-серый. Задняя часть брюха, голени ("штаны") и подхвостье рыжие. У самок спина, надхвостье, крылья и хвост сизые, с темными поперечными полосами; голова светло-рыжая, у глаза черное пятно. Брюшная сторона тела рыжая, как и голова, иногда с продольными темными штрихами. Молодые птицы сверху темно-бурые, с сизым оттенком, снизу светло-охристые, с размытыми продольными темными пятнами. Радужина темно-бурая; когти белые; клюв голубоватый, чернеющий к вершине; ноги, кольцо вокруг глаза и восковица у молодых желтые, у взрослых самок оранжевые, у самцов красные. Голос - звонкое "ки-ки-ки". Малоосторожен.
Общее распространение. Евразия от Прибалтики, Польши, Венгрии, Румынии к востоку до бассейна Вилюя, верхней Лены, западного побережья Байкала. К северу в бассейне Оби до 62-й параллели, к югу в Казахстане до 50-й параллели. В Западной Сибири распространен в лесостепной и степной зонах, где имеется древесная растительность в лесной зоне обычен к северу до Кети и Тыма. В Омской области это обычный гнездящийся вид в пойменной уреме р. Иртыш и в колках лесостепи; в степи редок.
Распространение в области. На гнездовании этот вид отмечен в Чистоозерном, Карасукском, Здвинском, Куйбышевском и Чановском районах, на Новосибирском водохранилище.
Места обитания. Излюбленными местами обитания кобчика в лесной зоне являются вырубки и гари, шелкопрядники, долины крупных рек, реже болота. В степной и хотя бы небольшие участки древесной растительности, в культурном ландшафте с садами, парками и рощами.
Численность и тенденции ее изменения. Точные данные отсутствуют. В целом малочисленный, местами обычный вид. Обилие кобчика, по-видимому, подвержено значительным годовым колебаниям.
Основные лимитирующие факторы. Численность гнездящихся кобчиков прямо связана с обилием прямокрылых и стрекоз. Отрицательное воздействие может оказывать применение пестицидов.
Особенности биологии и экологии. Гнездящаяся, перелетная птица. Половозрелость наступает в возрасте около года. На местах гнездования появляется поздно - в начале мая, что связано с питанием кобчика преимущественно насекомыми. Обычно кобчики используют гнезда других птиц - в особенности грачей, а также ворон. При обилии корма нередко образуют небольшие колонии. Иногда кобчики гнездятся в дуплах и на кустах. Кладка в конце мая-июне состоит из 3-5, иногда 6 ржаво-красных пестрых яиц. Насиживание производится с первого яйца, длительность его 28

дней. Насиживают и самка, и самец. Птенцов в выводке чаще всего 3. С середины июля до начала августа происходит вылет птенцов. Выводки держатся у гнезд около двух недель, после чего откочевывают. Отлет и осенний пролет наблюдается в конце августа-первой половине сентября. Основной корм кобчика - насекомые (прямокрылые - саранча и кобылки, стрекозы, жуки), которых кобчик ловит лапами на лету, иногда собирает на земле. Реже ловит мелких млекопитающих (мышей, полевок), изредка нападает на мелких воробьиных птиц.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Запрещен к отстрелу охотничьим законодательством. Одно из мест гнездования находится на территории Чановского заказника.

Необходимые меры охраны. Запрещать применение пестицидов в местах гнездования вида, повышать охотничью культуру.

Неясыть длиннохвостая

Strix uralensis Pallas, 1771

Отряд Совообразные *(Strigiformes)*

Семейство Совиные *(Strigidae)*

Таксономическое положение. Политипический вид. Представитель политипического рода, один из 3 видов рода в фауне России и области. На юге Западной Сибири обитает номинативный подвид.

Статус. IV категория.

Краткое описание вида. Крупная (заметно крупнее вороны) сова с длинным полосатым хвостом и рыхлым пушистым оперением. Общая окраска спинной стороны беловато-охристая с бурым продольным рисунком и слабыми поперечными отметинами на больших перьях. Маховые и рулевые буровато-охристые с темно-бурым поперечным рисунком. Брюшная сторона беловато-охристая или чисто белая с четкими бурыми продольными пятнами. Лицевой диск светлый, окаймленный мелкими пестрыми перышками. "Ушей" нет. Пальцы оперены до когтей. Радужина темно-бурая, клюв желтый, когти черные. В отличие от других неясытей длиннохвостая в полете держится не совсем горизонтально несколько опустив заднюю часть тела. Голос - лающее довольно высокое "хау... хау... хау". Самка, помимо "лая", иногда издает более высокий звук "вак-вак". Призывный крик длиннохвостой неясыти - это низкое протяжное гудение и еще более низкий двойной звук. Песня самца воспринимается как повторение слогов "уув-ув-ув", самки - "ыы-ыу-ыу-ыу".

Общее распространение. Евразия от Скандинавии к востоку до бассейна верхней Колымы, побережий Охотского и Японского морей, а также Сахалин и Японские острова. К северу - до 69-й параллели, к югу - до 56-53-й параллели. В Омской области это малочисленный, но широко распространенный гнездящийся вид,

совершающий зимой кочевки. **Распространение в области.** Длиннохвостая неясыть в летнее время отмечалась в лесопарковой зоне Академгородка и в окрестностях С. Чулым (Здвинский р-н). Во время осенних кочевок неоднократно регистрировалась в окрестностях с. Широкая Курья (Здвинский р-н), а зимой одна особь подобрана ослабевшей в г. Новосибирске. Заказники Болотнинского района. **Места обитания.** Обитает преимущественно в высокоствольных смешанных лесах со значительной примесью хвойных пород, часто переувлажненных. Селится по окраинам лесных массивов, поблизости от больших полян, обширных вырубок и гарей, в разреженных лесах и колках. В зимний период кочует до степной зоны.
Численность и тенденции ее изменения. Распределение и численность вида на территории области слабо изучены. В сосново-боровом ландшафте лесопарковой зоны Новосибирского Академгородка в первой половине лета обилие длиннохвостой неясыти составило в среднем 0,9 особей на 1 км, во второй половине лета - 0,2 особей на км. В европейской части ареала этого вида отмечается тенденция к увеличению обилия.
Основные лимитирующие факторы. Благополучие длиннохвостой неясыти во многом зависит от обилия основного корма - мышевидных грызунов. На территории области, кроме случаев отстрела охотниками, этому виду, вероятно, ничто не угрожает. **Особенности биологии и экологии.** Гнездящаяся, кочующая и зимующая птица. Гнездится на деревьях в старых гнездах хищных птиц (ястребов-тетеревятников, канюков, осоедов), в нишах-полудуплах прогнивших пней, иногда прямо на земле под прикрытием вывороченного пня или низко свисающих еловых лап. Кладка в апреле, состоит из 2-4 белых яиц. К насиживанию первого яйца самка приступает после откладки и сидит очень плотно. В это время она не охотится, и ее кормит самец. Насиживание одного яйца продолжается чаще всего 28 суток, птенцы вылупляются с интервалом через ночь. Совята остаются в гнезде в течение месяца жизни. Птенцовая смертность очень велика, и в летном выводке редко бывает свыше двух молодых птиц. Характерной чертой поведения взрослых птиц, особенно самок, возле выводка являются активность и смелость при защите птенцов. Основным кормом длиннохвостой неясыти являются мышевидные грызуны, в частности, полевки. Иногда ловит землероек, лягушек, насекомых (преимущественно жуков), а также слетков воробьиных птиц. Она в состоянии осилить белку, рябчика, белую куропатку и тетерева. **Разведение.** Данных нет.
Принятые меры охраны. Как и все виды сов, защищена природоохранным законодательством.
Необходимые меры охраны. Шире проводить среди населения разъяснительную работу о необходимости охраны вида.

Неясыть бородатая

Strix nebulosa Forster, 1772.
Отряд Совообразные (*Strigiformes*)
Семейство Совиные (*Strigidae*)
Таксономическое положение. Политипический вид. Представитель политипического рода, один из 3 видов рода в фауне России и области. В пределах России обитает S.n. lapponica.
Статус. III категория.
Краткое описание вида. Очень крупная дымчато-серая сова. Размах ее крыльев около полутора метров. Однако вес не особенно велик: взрослые самцы достигают 700-800 г, самки весят несколько более килограмма. Название она получила за темную окраску клина перьев под клювом - "бороду". Общая окраска спинной стороны серовато-бурая с густым продольным и поперечным рисунком. Брюшная сторона беловатая с крупными размытыми продольными пятнами, перья на боках с поперечными пестринами. Маховые темно-бурые с охристым поперечным рисунком. Рулевые темно-бурые с неправильным светлым поперечным рисунком. Лицевой диск сероватый с черными концентрическими полосками и черными пятнами у глаз. Глаза небольшие с ярко-желтой радужиной, клюв желтый, когти серовато-бурые. Призывный крик самца - низкие, но мощные выкрики "гуу-гу-гу". Самка в ответ иногда протяжно гудит "гуууу". Брачная песня бородатой неясыти представляет собой серию глухих звуков вроде "гу", воспроизводимых в возрастающем темпе в течение восьми-девяти секунд.
Общее распространение. Населяет таежную зону Северной Америки и Евразии. На север бородатая неясыть распространена до границы лесов; к югу в европейской части России примерно до 55-й параллели, в Западной Сибири - до 56-й параллели.
Распространение в области. На гнездовании отмечена в окрестностях поселков Украинка и Останинка (Северный р-н) и около Академгородка. В период осенних кочевок добывалась в Северной Кулунде. Заповедники Болотнинского района.
Численность и тенденции ее изменения. Малочисленный вид. Точные
Основные лимитирующие факторы. На территории области виду, вероятно, ничто не угрожает.
Особенности биологии и экологии. Гнездящаяся, оседлая и нерегулярно кочующая птица. Кладку в апреле бородатые неясыти помещают, как правило, открыто, например, в старом гнезде хищной птицы. Чаще всего используются старые гнездовые сооружения канюка, осоеда, иногда гнезда скопы и еще реже - тетеревятника. Не пренебрегает бородатая неясыть и высокими пнями с частично выгнившей сердцевиной, образовавшей лоток. В кладке 3-4, реже 5 белых яиц. К насиживанию самка приступает с откладки последнего яйца. Срок инкубации - 28 суток. Самец бдительно охраняет

гнездовой участок и регулярно приносит самке корм. У гнезда с птенцами родители ведут себя на редкость агрессивно. В период выкармливания птенцов самец деятелен не только в сумерках и ночью, но и днем. Примерно через месяц после вылупления птенцы покидают гнездо и постепенно удаляются от гнездового дерева. До середины сентября молодые держатся еще вместе. Пищу бородатой неясыти составляют главным образом мелкие грызуны. Иногда ей удается поймать бурундука или белку, очень редко - птиц.

Соловей обыкновенный

Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные *(Passeriformes)*
Семейство Мухоловковые *(Muscicapidae)*

Таксономическое положение. Монотипический вид. Представитель политипического рода, один из 7 видов рода в фауне России и 5 видов в фауне области. **Статус.** IV категория. **Краткое описание вида.** Размер с воробья. Стройная, высокая на ногах птица. Спинная сторона рыжевато-оливково-бурая, надхвостье одного цвета со спиной. Брюшная сторона белесая, бока и зоб серовато-бурые. На горле и груди заметны коричневые волнистые пестринки. Сигналов тревоги два: характерный свист ("тии") и "крыканье" ("крр... крр..." или "кры... кры..."). Песня - звучные разнообразные звуки, своеобразные по типам у каждого самца и в каждой популяции **Общее распространение.** Евразия от Южной Швеции и Дании к востоку до 90-го меридиана. В европейской части ареала на севере до 60-й параллели, в Западной Сибири - до 58-й параллели. Южная граница проходит в Юго-Восточной Австрии, Южной Венгрии, по северному побережью Черного моря, через Северный Кавказ, среднее течение р. Урал, Центральный Казахстан и Юго-Западный Алтай. Заказники Болотнинского района. **Распространение в области.** В Новосибирской области приводится для Кулундинской степи, встречен в гнездовое время в Северном р-не, в окрестностях поселков Украинка и Останинка (Северный р-н), гнездится по протокам р. Омь, отмечен в лесопарковой зоне Новосибирского Академгородка и нижнем течении р. Иня. **Места обитания.** Излюбленные места гнездования - густые, тенистые заросли черемухи, калины, крушины и жимолости в пойме реки или около ручья. Охотно гнездится в зарослях крапивы, некоторых зонтичных и припойменных кустарников, например, бузины. Иногда гнездится на заросших кустарниками, заболоченных и захламленных вырубках, запущенных садах, парках, на кладбищах.
Численность и тенденции ее изменения. Всюду редок и таких многочисленных поселений ,как в европейской части ареала, не образует. В лесопарковой зоне Новосибирского Академгородка в

первой половине лета обилие этого вида составляет 0,03 особей на км^2. Какой-либо тенденции в изменении численности не отмечено.
Основные лимитирующие факторы. Как влаголюбивая птица, обыкновенный соловей чувствителен к изменениям обводненности территории. В периоды сильных засух возможны переселения целых популяций .
Особенности биологии и экологии. Гнездящаяся и перелетная птица. Гнездо чаще строится на земле в ямке и так, что его край почти не выступает над поверхностью. Изредка гнездо располагается в основании куста, но тоже у самой земли. Кладку из 4-5 оливковых или коричнево- оливковых яиц в мае-июне в течение 13-14 дней насиживает одна самка. Выкармливают птенцов 11-12 дней оба родителя. Еще 13-15 дней они остаются с выводком и подкармливают молодых. Отлет соловьев с мест гнездования происходит в конце июля - в августе. Одиночные птицы могут быть встречены и в сентябре.
Корм соловьи собирают главным образом на земле, реже с ветвей и листьев кустарников. Значительную часть их пищи составляют муравьи и обитатели подстилки: мелкие моллюски, пауки, многоножки, мухи, личинки жуков, долгоносики, листоеды, гусеницы и бабочки, клопы. Осенью соловьи нередко поедают ягоды бузины, черной смородины.
Разведение. Нет данных.
Принятые меры охраны. Гнездование этого вида возможно на территории имеющихся заказников, а также в лесопарковой зоне Новосибирска и Академгородка.
Необходимые меры охраны. Выявить основные места гнездования, исключить там фактор беспокойства и любые мелиоративные мероприятия.

Сорокопут серый

Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные *(Passeriformes)*
Семейство Сорокопутовые *(Laniidae)*
Таксономическое положение. Политипический вид. Представитель политипического рода, один из 9 видов рода в фауне России и 4 видов в фауне области. От западных границ России до Енисея распространен номинативный подвид.
Статус. IV категория.
Краткое описание вида. Крупный сорокопут размером с дрозда. Хвост длинный ступенчатый, крылья относительно короткие, закругленные. Клюв крепкий, крючкообразно загнутый на конце, с большим зубцом на надклювье. Ноги сильные, с острыми загнутыми когтями. Отличительной особенностью этого вида является максимальное среди всей группы сорокопутов развитие хищнических черт. В окраске характерно сочетание серого, черного и белого цветов. У взрослого самца верх головы, спина, плечевые, малые

кроющие крыла пепельно-серые, надхвостье более светлое. Брюшная сторона белая, с более или менее развитым поперечным рисунком. Широкая полоса от клюва через глаз к уху, крылья и хвост черные. На крыле одно или два больших белых пятна, белый цвет в разной степени развит и на боковых рулевых. Клюв и ноги черные. Самки и молодые птицы более темные, с буроватым оттенком. Голос - грубое "чек, чек". Песня состоит из негромких скрипучих, жужжащих, трелевых и свистовых звуков, чередующихся с имитациями звуков других видов птиц.

Общее распространение. Встречается в Северной Америке, Северной Африке и почти во всей Евразии.

Распространение в области. Может быть встречен повсюду, но почти везде очень редок. Достоверно найден на гнездовании на севере Барабы, в районе р.ц. Карасук и у о.п .Береговое на Новосибирском водохранилище. Заказники Болотнинского района

Места обитания. Открытые пространства с кустарником (чаще всего колючим) и хотя бы одиночными деревьями вырубки и гари, зарастающие болота.

Численность и тенденции ее изменения. Не изучена. В последние десятилетия, по-видимому, сократилась.

Основные лимитирующие факторы. Не изучены.

Особенности биологии и экологии. Гнездящаяся, кочующая и, отчасти, оседлая птица. На местах гнездования появляется в апреле-мае. Гнездо строит преимущественно самка, обычно на высоте 1-2,5 м. Крепится оно у ствола или на толстой ветви куста или дерева. В стенку гнезда часто вплетаются зеленые веточки, лоток выстилается травинками и шерстью. Полная кладка в мае-июне из 4-6 яиц, беловато-зеленых с буроватыми поверхностными и серовато-фиолетовыми глубинными пятнами. Насиживание продолжается около 15 дней. Птенцов в гнезде выкармливают оба родителя 19-20 дней исключительно насекомыми, преимущественно жуками и прямокрылыми. Взрослые сорокопуты питаются как крупными насекомыми, так и разнообразными позвоночными: мелкими птицами, грызунами, землеройками, лягушками и ящерицами. Иногда добычу накалывает на шипы. Откочевка на места зимовки происходит в октябре-ноябре.

Разведение. Нет данных.

Принятые меры охраны. Гнездование этого вида возможно на территории существующих в области заказников.

Необходимые меры охраны. Поиск мест с максимальным обилием гнездящихся птиц этого вида и создание здесь микрозаказников.